



Association des Aidants
et Malades à Corps de Lewy

Colloque A2MCL maladie à corps de Lewy

Rennes 7 novembre 2025





Module 1

Les premiers temps de la maladie

Module présidé par :

Pr Frédéric BLANC

Neuro-gériatre – CHRU Strasbourg

Dr Jean-Michel DOREY

Psychiatre – CHU Lyon



Module 1

Quand c'est la psychiatrie qui alerte en premier

Regards croisés : psychiatrie


Pr Gabriel ROBERT

Psychiatre CHU Guillaume Regnier -Rennes




Regards croisés: psychiatrie

Forme prodromale – Début psychiatrique




Regards croisés : psychiatrie

Formes prodromales – expression psychiatrique



Proportion de sp



Proportion de sp non cognitifs

Regards croisés: psychiatrie

Critère de McKeith 2020

- o Apparition tardive de dépression caractérisée
- o Apparition tardive d'épisodes délirants et délire d'identification (Capgras > Fregoli)

- o Mais formes subtiles sont très fréquentes
 - Tristesse
 - Apathie
 - Anxiété
 - Modification de personnalité

 - Illusion
 - Sensation de présence
 - Voile en vision périphérique
 - Sensation d'être attendu ailleurs

 - Comportements répétitifs (TOC)

Regards croisés: psychiatrie

Comment faire ?

o Être en alerte

- Les troubles psychiatriques d'apparition tardive constituent un drapeau rouge
- Mais..... formes prodromales – sujets 'jeunes'
- Moyenne=63 ans [53-88]

o Examiner physiquement

- Signes neurovégétatifs
 - o Hypotension orthostatique
 - o Constipation
- Syndrome extra-pyramidal
 - o Unilatéral
- Troubles du sommeil paradoxal
 - o Pas toujours facile d'avoir le conjoint
 - o Isolement

Psychotropes

3.8% des formes prodromales psychiatriques Gunawardana et al. 2024

Intolérance aux neuroleptiques (BMJ 1992)

Neuroleptic sensitivity in patients with senile dementia of Lewy body type

Ian McKeith, Andrew Fairbairn, Robert Perry, Peter Thompson, Elaine Perry

- Intolérance sévère dans 50% cas
- Appartient à la catégorie des critères secondaires depuis 2017

- Sédation +++
- Chutes et instabilité posturale
- Syndrome extra-pyramidal sévère
- Syndrome confusionnel
- Syndrome malin des neuroleptiques

Regards croisés: psychiatrie

Fluctuations – l’apanage de la psychiatrie ?

- Changement de paradigme
- Avec le syndrome confusionnel
- Seule atteinte qui signe une atteinte neurologique
- Présence d’un tiers ?

Tableau 1. Échelle de fluctuations cognitives et de vigilance adaptée du *Fluctuation Mayo questionnaire*, 2004.

Table 1. *Scale of cognitive and vigilance fluctuations adapted from the Fluctuation Mayo questionnaire, 2004.*

	Participant		Accompagnant	
Êtes-vous (est-il ou est-elle) somnolent ou léthargique pendant la journée, alors que vous avez (il ou elle a) suffisamment dormi la nuit d’avant ?	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui
Dormez-vous (dort-il) plus de 2 heures pendant la journée (avant 19 heures du soir) ?	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui
Vous arrive-t-il (lui arrive-t-il ou-elle) d’avoir le regard fixe pendant de longues périodes ?	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui
Avez-vous (a-t-il ou elle) des épisodes pendant la journée où le flot de vos (ses) idées est désorganisé, pas clair ou bien illogique ?	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui

Regards croisés: psychiatrie

Conclusion

- Formes prodromales à expression psychiatrique
 - Reconnue par experts internationaux
- Fréquente
 - Caractéristiques
- Forme subtile
 - Cluster « affectif » - apathie, anxiété, personnalité
 - Cluster « psychotique » - illusion, sensation de présence
- Mais.....
- Il existe aussi des dépressions et des psychoses d'apparition tardive sans MCL



Association des Aidants
et Malades à Corps de Lewy

www.a2mcl.org

06 62 63 34 97

contact@a2mcl.org

